

INFECCIÓN POR VIH AÑO 2010

Plan de Prevención y Control del Sida




Osakidetza

Principales resultados


- Desde 1997 se ha declarado un total de 2.472 nuevas infecciones por VIH, registrándose en 2010 un descenso de un 13,5% respecto a 2009.
- En 2010 se han notificado 179 nuevos diagnósticos de VIH, lo que supone una tasa de 84,8/millón de habitantes. Tasa ligeramente superior a la registrada a nivel estatal (79,3/millón de habitantes).
- El 75,8% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media de las personas diagnosticadas es de 38 años.
- En relación a la práctica de riesgo, la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres (41,2%) casi iguala a la transmisión a través de relaciones heterosexuales (43%).
- El 34,5% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas.
- El 43,7% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).

Nuevos diagnósticos de VIH por año, 1997-2010




Total casos: 2.472


Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por Territorio Histórico. Año 2010




Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por hospital. Año 2010




Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por sexo. Año 2010




Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por edad. Año 2010




Nuevos diagnósticos de VIH. Vía de transmisión. Año 2010



Nuevos diagnósticos de VIH. Vía de transmisión. Año 2010




Hombres



Mujeres

Nuevos diagnósticos de VIH. Zona de origen. Año 2010



Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío. Año 2010

