



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN LOS NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN 2010 EN UNA CLÍNICA DE ITS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (C. S. SANDOVAL)

Casanova M, Iriarte A, Prado C, Vera M, Villa M, Puerta T, Rodríguez C, Menéndez B, Tello E, Clavo P, Ballesteros J, Martín C, Carrió JC, Mozo I, Del Romero J.



P-031

OBJETIVOS:

1. Analizar la incidencia de ITS concomitantes en los pacientes diagnosticados, durante el año 2010, de infección por el VIH en una clínica de ITS de la Comunidad de Madrid.
2. Definir las características clínicas y socio-demográficas de los nuevos diagnósticos de VIH que presentaron coinfección con sífilis, chlamydia y gonococia.
3. Evaluar la relación con las conductas sexuales de riesgo y los hábitos tóxicos en los pacientes coinfectados VIH-ITS.


MATERIAL Y MÉTODOS:

-En el año 2010 se practicaron un total de 5.730 serologías del VIH, de las cuales 341 resultaron positivas (5.9%).

-A los 341 pacientes VIH+ se les realizaron pruebas diagnósticas de lúes, gonococia y chlamydia (serología y exudados) y se identificaron aquellos que presentaron coinfección.

-Variables a estudio: Edad, sexo, país de origen, nivel de estudios, prácticas sexuales de riesgo, antecedentes de ITS, hábitos tóxicos y relaciones sexuales no protegidas bajo el efecto de alcohol/drogas.

Categoría de exposición de las personas que solicitaron la serología del VIH en 2010 (N = 5.730)







RESULTADOS

De los 341 nuevos diagnósticos de VIH, 26 presentaron VIH/gonococia, 69 pacientes VIH/Sifilis y 33 VIH/Chlamydia.

El 38.7% (132) de los nuevos diagnósticos de VIH durante el año 2010 presentaban otra ITS concomitante en el momento del diagnóstico; de ellos 128 (96.9%) eran hombres, 2 transexuales (1.5%) y 2 mujeres (1.5%). El 47.7% eran españoles. Entre los extranjeros, aquellos que con más frecuencia presentaron otra ITS concomitante, fueron los procedentes de Latinoamérica (37.8%). El 65% de los pacientes con coinfección presentaban antecedentes personales de ITS, en contraste con el 28.7%, que nunca había sido diagnosticado una ITS.

Un 66.6% referían consumo "excesivo" de alcohol; 25.7% consumían cocaína; 18.9% cannabis, ya sea en forma de hachís o de marihuana; 25.7% poppers; 7.5% ketamina; 13.6% GHB y 9.8% éxtasis.



CONCLUSIONES:

- 1) En los nuevos diagnósticos del VIH se observa una elevada incidencia de otras ITS, así como de antecedentes de ITS.
- 2) Es recomendable realizar el cribado de otras ITS a los nuevos diagnósticos del VIH y estudiar a sus contactos.
- 3) La mayoría de los pacientes que presentaron VIH/otras ITS referían haber mantenido relaciones sexuales desprotegidas bajo los efectos del alcohol/drogas.
- 4) Las clínicas de ITS son dispositivos asistenciales estratégicos para el diagnóstico precoz del VIH y otras ITS.