

Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya.

Actualització a 30 de juny de 2012

Índex

Introducció	5
Sífilis infecciosa	6
Gonocòccia	8
Limfogranuloma veneri	9
ITS de declaració numèrica/agregada	10

Taules

Nombre de casos de sífilis i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 1998-2011	12
Nombre de casos de gonocòccia i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 1998-2011...	13
Nombre de casos de limfogranuloma veneri i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 2007-2011	14
Nombre de casos de sífilis segons sexe i regió sanitària, 2007—2011	15
Nombre de casos de gonocòccia segons sexe i regió sanitària, 2007—2011	16
Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons sexe i regió sanitària, 2007—2011	17
Nombre de casos de sífilis segons edat i regió sanitària, 2007-2011	18
Nombre de casos de gonocòccia segons edat i regió sanitària, 2007-2011.....	20
Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons edat i regió sanitària, 2007-2011.....	22
Nombre de casos de sífilis segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2011	24
Nombre de casos de gonocòccia segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2011 .	26
Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2011	28

Figures

Evolució dels casos de sífilis. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 1992-2011	30
Evolució dels casos de gonocòccia segons quarts d'any. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012.....	30
Evolució dels casos de sífilis segons sexe. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011.....	30
Distribució dels casos de sífilis segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011.....	31
Distribució dels casos de sífilis segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011	31
Evolució dels casos de sífilis segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011.....	32

Distribució dels casos de sífilis segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	32
Distribució dels casos de sífilis segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	32
Distribució dels casos de sífilis en immigrants segons zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011	33
Distribució dels casos de sífilis segons coinfecció amb el VIH. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	33
Distribució dels casos de sífilis segons coinfecció amb el VIH i orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011	33
Evolució dels casos de gonocòccia. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 1992-2011	34
Evolució dels casos de gonocòccia segons quarts d'any. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012	34
Evolució dels casos de gonocòccia segons sexe. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	34
Distribució dels casos de gonocòccia segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	35
Distribució dels casos de gonocòccia segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011	35
Evolució dels casos de gonocòccia segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	36
Distribució dels casos de gonocòccia segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	36
Distribució dels casos de gonocòccia segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	36
Distribució dels casos de gonocòccia en immigrants segons zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011	37
Distribució dels casos de gonocòccia segons coinfecció amb el VIH. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	37
Distribució dels casos de gonocòccia segons coinfecció amb el VIH i orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011	37
Evolució dels casos de limfogranuloma veneri. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	38
Evolució dels casos de limfogranuloma veneri segons quarts d'any. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012	38
Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	38

Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011	39
Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	39
Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	39
Distribució dels casos de limfogranuloma veneri en immigrants segons zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011.....	40
Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons coinfecció amb el VIH. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011	40
Evolució dels casos d'infecció genital per <i>Chlamydia trachomatis</i> D-K . Registre MDO numèrica de Catalunya, 1992-2011.....	40
Evolució dels casos d'infecció genital pel <i>virus de l'herpes simple</i> . Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2011.....	41
Evolució dels casos de condiloma acuminat. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2011.....	41
Evolució dels casos d'infecció per <i>Tricomonas Vaginalis</i> . Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2011.....	41

Introducció

Actualment, a Catalunya, la vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual (ITS) es realitza a través de sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO), on el professional sanitari notifica un cas per sospita clínica fent servir els criteris consensuats de les malalties sotmeses a declaració. Les MDO poden ser de declaració urgent, numèrica o individualitzada. Pel que fa a les ITS, la infecció genital per clamídia, el condiloma acuminat, l'herpes genital, la tricomoniasis, l'oftalmia neonatal i l'agregat d'Altres ITS són MDO numèriques mentre que la sífilis infecciosa, la gonocòccia i el limfogranuloma veneri es declaren com a MDO individualitzades des de l'any 2007 i la sífilis congènita des de 1997.

La definició de cas sospitós i confirmat de les ITS es pot trobar en el document *Definició de cas de les malalties de declaració obligatòria* que elabora anualment el Departament de Salut (disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Vigilancia_epidemiologica/documents/spdefimdo.pdf).

El present informe té l'objectiu de descriure les característiques epidemiològiques i les tendències de les ITS sotmeses a vigilància epidemiològica fins a l'any 2011 i les dades del primer semestre del 2012.

Sífilis infecciosa

La sífilis infecciosa va estar una MDO numèrica fins l'any 2006. A partir de l'any 2007 passa a ser una MDO individualitzada amb la complementació per part del professional sanitari d'una enquesta epidemiològica estandarditzada.

Els estadis clínics que són objecte de vigilància epidemiològica són la sífilis primària, secundària i latent precoç.

Notificacions del primer semestre del 2012

Entre el gener i el juny del 2012 s'han notificat un total de 321 casos de sífilis, el 74,1% homes.

Notificacions de l'any 2011

L'any 2011, s'han notificat 524 casos de sífilis, el que representa una taxa global de 7,3 casos per 100.000 habitants.

El 58,7% dels casos notificats han estat sífilis primàries o secundàries, el 31,2% han estat latent precoç o indeterminada i en un 10,1% dels casos no s'ha disposat d'informació sobre l'estadi clínic.

El 87,4% dels casos són homes i el 12,6% dones, essent les taxes de 12,9 i 1,8 casos per 100.000 habitants, respectivament. La ràtio home-dona és de 7:1.

La mitjana d'edat dels casos ha estat de 35,0 anys, dels quals el 36,1% s'inclouen en el grup de 25 i 34 anys i el 33,5% entre 35 i 44 anys.

Quant al lloc d'origen dels casos, el 43,7% dels casos han estat notificats en persones nascudes fora de l'Estat espanyol. Del total (229), el 57,2% pertany a persones originàries de països d'Amèrica Llatina.

Pel que fa a la via de transmissió, la més freqüent ha estat els homes que tenen sexe amb altres homes (56,9%) seguit dels homes i dones heterosexuales (9,4% i 8,8%, respectivament). Cal tenir present però, que el 23,3% dels casos de sífilis la transmissió és desconeguda.

Un aspecte important a tenir en compte, és la proporció de casos de sífilis amb una coinfecció pel VIH en el moment del diagnòstic. L'any 2011, el 24,0% dels casos de sífilis eren VIH positius.



Tendències per al període 1990-2011

La taxa de sífilis va experimentar un descens del 80% entre 1990 i 1995, passant de 7,1 a 1,4 casos per 100.000 habitants. Per al període 1996-2002 s'observa una estabilització dels casos. A partir de l'any 2003 i fins el 2011, la taxa de casos de sífilis s'incrementa un 137%. Per a l'any 2011, i en comparació amb el 2010, la taxa de sífilis ha experimentat un increment del 13%.

Sífilis congènita

Durant l'any 2011, no s'ha notificat cap cas de sífilis congènita a Catalunya.

Gonocòccia

La gonocòccia va estar una MDO numèrica fins l'any 2006. A partir de l'any 2007 passa a ser una MDO individualitzada amb la complementació per part del professional sanitari d'una enquesta epidemiològica estandarditzada.

Notificacions del primer semestre del 2012

Entre el gener i el juny del 2012 s'han notificat un total de 283 casos de gonocòccia, el 80,6% homes.

Notificacions de l'any 2011

L'any 2011, s'han notificat 510 casos de gonocòccia, el que representa una taxa global de 7,1 casos per 100.000 habitants.

El 81,8% dels casos són homes i el 18,2% dones, essent les taxes de 11,8 i 2,6 casos per 100.000 habitants, respectivament. La ràtio home-dona és de 5:1.

La mitjana d'edat dels casos ha estat de 31,0 anys, dels quals el 42,2% s'inclouen en el grup de 25 i 34 anys i el 24,3% entre 35 i 44 anys.

Quant al lloc d'origen dels casos, el 33,1% dels casos han estat notificats en persones nascudes fora de l'Estat espanyol. Del total (169), el 49,7% pertany a persones originàries de països d'Amèrica Llatina.

Pel que fa a la via de transmissió, la més freqüent ha estat els homes que tenen sexe amb altres homes (27,6%) seguit dels homes heterosexuais (19,0%). Cal tenir present però que el 40,8% dels casos de gonocòccia la transmissió és desconeguda.

En el cas de la gonocòccia, la proporció de casos que presenten una coinfecció amb el VIH és del 9,8%, tot i que en el 54,3% era desconegut.

Tendències per al període 1990-2011

La taxa de gonocòccia va experimentar un descens del 94% entre 1990 i 1999, passant de 55,8 a 3,2 casos per 100.000 habitants. A partir de l'any 2000 i fins el 2011, la taxa de casos de gonocòccia s'incrementa un 102%. Per a l'any 2011, i en comparació amb el 2010, la taxa de gonocòccia ha experimentat un descens del 5%.

Limfogranuloma veneri

El limfogranuloma veneri (LGV) s'incorpora l'any 2007 a la llista de les ITS de declaració obligatòria individualitzada amb la complementació per part del professional sanitari d'una enquesta epidemiològica estandarditzada.

Notificacions del primer semestre del 2012

Entre el gener i el juny del 2012 s'han notificat un total de 23 casos de LGV , el 100% homes.

Notificacions de l'any 2011

L'any 2011, s'han notificat 89 casos de LGV, el que representa una taxa global de 1,2 casos per 100.000 habitants.

El 100% dels casos són homes (taxa de 2,5 casos per 100.000 habitants) amb una mitjana d'edat 35,0 anys, dels quals el 44,9% s'inclouen en el grup de 25 i 34 anys i el 39,3% entre 35 i 44 anys.

Quant al lloc d'origen dels casos, el 42,7% dels casos han estat notificats en persones nascudes fora de l'Estat espanyol. Del total (38), el 50% han estat en persones provinents d'Amèrica Llatina i Carib i el 39,5% en persones provinent d'Europa Occidental.

Pel que fa a la via de transmissió, el 96,6% han estat casos notificats en homes que tenen sexe amb altres homes i el 92,1% dels casos tenien una coinfecció amb el VIH en el moment del diagnòstic.

Tendències per al període 2007-2011

Des de que l'any 2005 es va diagnosticar el primer cas de LGV aquesta infecció ha passat de ser una malaltia rarament diagnosticada a una malaltia emergent. L'any 2008 i el 2011, s'han notificat dos brots de LGV en persones residents en la majoria a la ciutat de Barcelona.

ITS de declaració numèrica/agregada

Pel que fa a la infecció genital per **Clamídia** durant el 2011 s'han notificat 708 casos, el que representa una taxa de 9,8 casos per 100.000 habitants.

Pel que fa a **l'herpes genital** s'han notificat 1751 casos l'any 2011, el que representa una taxa de 24,4 casos per 100.000 habitants.

Durant l'any 2011, s'han notificat 4841 casos de **condiloma acuminat**, el que representa una taxa de 67,3 casos per 100.000 habitants.

Finalment, pel que fa a la **tricomoniàsis** s'han notificat 572 casos, el que representa una taxa de 8,0 casos per 100.000 habitants.

Resum i conclusions

- Durant el 2011, les notificacions de sífilis a Catalunya s'han incrementat quasi el 10% respecte el 2010.
- Els casos notificats de sífilis continuen sent en homes que tenen sexe amb altres homes, amb una mitjana d'edat de 35 anys i en els que quasi el 30% estan coinfectats amb el VIH.
- No s'ha declarat cap de cas de sífilis congènita al 2011.
- Durant el 2011, les notificacions de gonocòccia a Catalunya han disminuït en un 7% respecte el 2010.
- Els casos de gonocòccia s'han produït en homes HSH o heterosexual amb una mitja d'edat de 31 anys i d'origen autòcton.
- Els casos notificats de limfogranuloma veneri continuen sent en homes que tenen sexe amb altres homes amb una mitja d'edat de 35 anys amb símptomes de proctitis.
- Quasi el 97% dels casos de limfogranuloma veneri presenten una coinfecció amb el VIH.

Taula 1. Nombre de casos de sífilis i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 1998-2011

	Catalunya		Alt Pirineu i Aran		Barcelona ciutat		Barcelona-Zona Vallès		Barcelona-Zona Sud		Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme		Catalunya Central		Girona		Lleida		Camp de Tarragona		Terres de l'Ebre	
	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa
1998	121	0,9	0	0,0	19	1,3	21	0,3	17	0,7	9	2,3	5	2,1	43	5,3	5	0,5	2	0,7	0	0,0
1999	97	0,7	0	0,0	22	1,5	20	0,3	22	0,9	10	2,5	2	0,8	11	1,3	2	0,2	7	2,4	1	0,1
2000	92	0,7	0	0,0	22	1,5	10	0,2	17	0,7	17	4,3	4	1,6	13	1,5	5	0,5	4	1,4	0	0,0
2001	95	0,7	0	0,0	25	1,7	13	0,2	19	0,8	10	2,5	9	3,6	13	1,5	0	0,0	6	2,0	0	0,0
2002	142	1,0	0	0,0	75	4,9	11	0,2	15	0,6	8	2,0	7	2,7	19	2,1	2	0,2	4	1,3	1	0,1
2003	202	1,4	2	0,3	76	4,8	6	0,1	26	1,0	23	5,8	4	1,5	42	4,6	9	0,8	14	4,4	0	0,0
2004	219	1,5	0	0,0	85	5,4	14	0,2	33	1,3	11	2,7	4	1,5	50	5,3	2	0,2	14	4,3	6	0,7
2005	255	1,7	4	0,5	92	5,8	13	0,2	18	0,7	13	3,2	11	3,9	72	7,3	10	0,9	15	4,5	7	0,8
2006	356	5,0	5	7,0	210	13,1	10	0,8	24	1,9	16	2,0	9	1,9	50	7,4	13	3,9	13	2,4	6	3,4
2007	229	3,2	1	1,4	131	8,2	14	1,1	15	1,2	4	0,5	8	1,6	35	5,1	9	2,6	11	1,9	1	0,5
2008	346	4,7	1	1,3	199	12,3	10	0,8	28	2,2	21	2,7	8	1,6	57	8,0	15	4,3	5	0,8	2	1,1
2009	372	5,0	0	0,0	213	13,1	17	1,3	30	2,3	23	2,9	13	2,6	49	6,7	17	4,7	9	1,5	1	0,5
2010	461	6,2	0	0,0	288	17,8	17	1,3	42	3,2	31	3,9	10	2,0	44	6,0	13	3,6	10	1,6	6	3,1
2011	524	7,1	0	0,0	291	18,2	40	3,1	53	4,1	37	4,6	23	4,5	43	5,8	18	4,9	15	2,4	4	2,1

Taula 2. Nombre de casos de gonocòccia i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 1998-2011

	Catalunya		Alt Pirineu i Aran		Barcelona ciutat		Barcelona-Zona Vallès		Barcelona-Zona Sud		Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme		Catalunya Central		Girona		Lleida		Camp de Tarragona		Terres de l'Ebre	
	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa
1998	273	2,0	1	0,1	38	2,5	26	0,4	50	2,1	36	9,0	57	23,5	33	4,1	4	0,4	18	6,3	10	1,2
1999	199	1,5	3	0,4	39	2,6	18	0,3	30	1,2	22	5,5	39	16,0	21	2,5	4	0,4	13	4,5	10	1,2
2000	220	1,6	2	0,3	50	3,3	14	0,2	28	1,2	32	8,1	35	14,2	21	2,5	15	1,5	14	4,7	9	1,1
2001	190	1,4	0	0,0	47	3,1	17	0,3	17	0,7	23	5,9	26	10,4	27	3,1	6	0,6	12	4,0	15	1,8
2002	290	2,0	2	0,3	122	8,0	18	0,3	42	1,7	16	4,1	31	12,1	36	4,0	9	0,9	9	2,9	5	0,6
2003	356	2,4	9	1,2	104	6,6	24	0,4	85	3,4	21	5,3	24	9,1	39	4,2	26	2,4	17	5,4	7	0,8
2004	325	2,2	25	3,1	104	6,6	30	0,4	33	1,3	49	12,2	7	2,6	32	3,4	23	2,1	12	3,7	10	1,1
2005	284	1,9	3	0,4	115	7,2	42	0,6	26	1,0	17	4,2	11	3,9	26	2,6	14	1,2	27	8,1	3	0,3
2006	397	5,6	3	4,2	166	10,3	19	1,6	17	1,4	21	2,7	16	3,3	84	12,5	37	11,0	28	5,1	6	3,4
2007	374	5,2	3	4,1	193	12,1	39	3,2	23	1,8	17	2,2	13	2,7	62	9,0	3	0,9	11	1,9	10	5,5
2008	344	4,7	1	1,3	205	12,7	14	1,1	29	2,3	22	2,8	6	1,2	49	6,8	3	0,9	8	1,3	7	3,7
2009	414	5,6	0	0,0	256	15,8	21	1,6	26	2,0	27	3,4	6	1,2	63	8,6	7	1,9	7	1,1	1	0,5
2010	531	7,1	1	1,8	320	19,8	46	3,6	32	2,4	31	3,9	9	1,8	70	9,5	3	0,8	16	2,6	3	1,6
2011	510	6,9	0	0,0	252	15,8	51	3,9	50	3,8	41	5,1	20	3,9	68	9,2	3	0,8	17	2,7	8	4,2

Taula 3. Nombre de casos de limfogranuloma veneri i taxes per 100.000h segons regió sanitària, 2007-2011

	Catalunya		Alt Pirineu i Aran		Barcelona ciutat		Barcelona-Zona Vallès		Barcelona-Zona Sud		Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme		Catalunya Central		Girona		Lleida		Camp de Tarragona		Terres de l'Ebre	
	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa	N	Taxa
2007	7	0,1	0	0,0	7	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2008	35	0,5	0	0,0	28	1,7	0	0,0	3	0,2	3	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0
2009	14	0,2	0	0,0	10	0,6	0	0,0	1	0,1	1	0,1	2	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2010	28	0,4	0	0,0	24	1,5	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2011	89	1,2	0	0,0	84	5,3	0	0,0	3	0,2	2	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Taula 4. Nombre de casos de sífilis segons sexe i regió sanitària, 2007—2011

	2007				2008				2009				2010				2011			
	Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya	183	79,9%	46	20,1%	283	81,8%	63	18,2%	321	86,3%	51	13,7%	405	87,9%	56	12,1%	458	100,0%	66	100,0%
Alt Pirineu i Aran	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Barcelona ciutat	119	90,8%	12	9,2%	178	89,4%	21	10,6%	194	91,1%	19	8,9%	268	93,1%	20	6,9%	271	59,2%	20	30,3%
Barcelona-Zona Vallès	10	71,4%	4	28,6%	7	70,0%	3	30,0%	13	76,5%	4	23,5%	15	88,2%	2	11,8%	31	6,8%	9	13,6%
Barcelona-Zona Sud	14	93,3%	1	6,7%	19	67,9%	9	32,1%	24	80,0%	6	20,0%	36	85,7%	6	14,3%	43	9,4%	10	15,2%
Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme	2	50,0%	2	50,0%	15	71,4%	6	28,6%	20	87,0%	3	13,0%	24	77,4%	7	22,6%	31	6,8%	6	9,1%
Catalunya Central	6	75,0%	2	25,0%	6	75,0%	2	25,0%	13	100,0%	0	,0%	6	60,0%	4	40,0%	18	3,9%	5	7,6%
Girona	21	60,0%	14	40,0%	42	73,7%	15	26,3%	38	77,6%	11	22,4%	34	77,3%	10	22,7%	37	8,1%	6	9,1%
Lleida	5	55,6%	4	44,4%	9	60,0%	6	40,0%	10	58,8%	7	41,2%	11	84,6%	2	15,4%	13	2,8%	5	7,6%
Camp de Tarragona	5	45,5%	6	54,5%	4	80,0%	1	20,0%	8	88,9%	1	11,1%	6	60,0%	4	40,0%	13	2,8%	2	3,0%
Terres de l'Ebre	0	,0%	1	100,0%	2	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	5	83,3%	1	16,7%	1	,2%	3	4,5%

Taula 5. Nombre de casos de gonocòccia segons sexe i regió sanitària, 2007—2011

	2007				2008				2009				2010				2011			
	Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya	337	90,3%	36	9,7%	309	89,8%	35	10,2%	354	85,5%	60	14,5%	461	86,8%	70	13,2%	416	100,0%	93	100,0%
Alt Pirineu i Aran	3	100,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Barcelona ciutat	179	93,2%	13	6,8%	192	93,7%	13	6,3%	222	86,7%	34	13,3%	282	88,1%	38	11,9%	212	51,0%	40	43,0%
Barcelona-Zona Vallès Nord i Maresme	35	89,7%	4	10,3%	12	85,7%	2	14,3%	13	61,9%	8	38,1%	35	76,1%	11	23,9%	28	6,7%	23	24,7%
Barcelona-Zona Sud	20	87,0%	3	13,0%	21	72,4%	8	27,6%	19	73,1%	7	26,9%	30	93,8%	2	6,3%	42	10,1%	8	8,6%
Barcelona-Zona Barcelonès	15	88,2%	2	11,8%	17	77,3%	5	22,7%	25	92,6%	2	7,4%	27	87,1%	4	12,9%	33	7,9%	8	8,6%
Catalunya Central	11	84,6%	2	15,4%	5	83,3%	1	16,7%	4	66,7%	2	33,3%	7	77,8%	2	22,2%	19	4,6%	1	1,1%
Girona	54	87,1%	8	12,9%	44	89,8%	5	10,2%	57	90,5%	6	9,5%	60	85,7%	10	14,3%	58	13,9%	10	10,8%
Lleida	2	66,7%	1	33,3%	3	100,0%	0	,0%	7	100,0%	0	,0%	3	100,0%	0	,0%	3	,7%	0	,0%
Camp de Tarragona	9	81,8%	2	18,2%	8	100,0%	0	,0%	6	85,7%	1	14,3%	13	81,3%	3	18,8%	15	3,6%	2	2,2%
Terres de l'Ebre	9	90,0%	1	10,0%	7	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	3	100,0%	0	,0%	6	1,4%	1	1,1%

Taula 6. Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons sexe i regió sanitària, 2007—2011

	2007				2008				2009				2010				2011			
	Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona		Home		Dona	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya	7	100,0%	0	,0%	35	100,0%	0	,0%	14	100,0%	0	,0%	28	100,0%	0	,0%	89	100,0%	0	,0%
Alt Pirineu i Aran	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Barcelona ciutat	7	100,0%	0	,0%	28	100,0%	0	,0%	10	100,0%	0	,0%	24	100,0%	0	,0%	84	94,4%	0	,0%
Barcelona-Zona Vallès	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Barcelona-Zona Sud	0	,0%	0	,0%	3	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	3	3,4%	0	,0%
Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme	0	,0%	0	,0%	3	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	2	2,2%	0	,0%
Catalunya Central	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Girona	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Lleida	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Camp de Tarragona	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Terres de l'Ebre	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Taula 7. Nombre de casos de sífilis segons edat i regió sanitària, 2007-2011

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya										
<15	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
15-19	1	,4%	7	2,0%	11	3,0%	5	1,1%	13	2,5%
20-24	25	11,0%	36	10,4%	35	9,4%	40	8,7%	51	9,8%
25-34	94	41,4%	136	39,3%	156	41,9%	172	37,3%	189	36,2%
35-44	76	33,5%	92	26,6%	109	29,3%	165	35,8%	176	33,7%
>=45	30	13,2%	75	21,7%	61	16,4%	78	16,9%	93	17,8%
Total	227	100,0%	346	100,0%	372	100,0%	461	100,0%	522	100,0%
Alt Pirineu i Aran										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	1	100,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Barcelona ciutat										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	2	1,0%	7	3,3%	1	,3%	6	2,1%
20-24	11	8,5%	17	8,5%	19	8,9%	21	7,3%	21	7,2%
25-34	53	40,8%	82	41,2%	91	42,7%	119	41,3%	107	36,9%
35-44	49	37,7%	56	28,1%	67	31,5%	107	37,2%	112	38,6%
>=45	17	13,1%	42	21,1%	29	13,6%	40	13,9%	44	15,2%
Total	130	100,0%	199	100,0%	213	100,0%	288	100,0%	290	100,0%
Barcelona-Zona Vallès										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	5,0%
20-24	2	14,3%	2	20,0%	1	5,9%	4	23,5%	6	15,0%
25-34	6	42,9%	5	50,0%	10	58,8%	3	17,6%	14	35,0%
35-44	6	42,9%	1	10,0%	2	11,8%	7	41,2%	10	25,0%
>=45	0	,0%	2	20,0%	4	23,5%	3	17,6%	8	20,0%
Total	14	100,0%	10	100,0%	17	100,0%	17	100,0%	40	100,0%
Barcelona-Zona Sud										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	3,6%	0	,0%	0	,0%	2	3,8%
20-24	2	13,3%	1	3,6%	3	10,0%	3	7,1%	3	5,7%
25-34	7	46,7%	13	46,4%	14	46,7%	10	23,8%	21	39,6%
35-44	6	40,0%	8	28,6%	7	23,3%	21	50,0%	13	24,5%
>=45	0	,0%	5	17,9%	6	20,0%	8	19,0%	14	26,4%
Total	15	100,0%	28	100,0%	30	100,0%	42	100,0%	53	100,0%
Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	2	9,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,8%
20-24	1	25,0%	3	14,3%	2	8,7%	4	12,9%	3	8,3%
25-34	1	25,0%	4	19,0%	11	47,8%	10	32,3%	15	41,7%
35-44	1	25,0%	6	28,6%	5	21,7%	11	35,5%	11	30,6%
>=45	1	25,0%	6	28,6%	5	21,7%	6	19,4%	6	16,7%
Total	4	100,0%	21	100,0%	23	100,0%	31	100,0%	36	100,0%

Taula 7. Nombre de casos de sífilis segons edat i regió sanitària, 2007-2011 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya Central										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	10,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	2	25,0%	0	,0%	1	10,0%	2	8,7%
25-34	5	62,5%	4	50,0%	5	38,5%	3	30,0%	8	34,8%
35-44	1	12,5%	1	12,5%	8	61,5%	2	20,0%	8	34,8%
>=45	2	25,0%	1	12,5%	0	,0%	3	30,0%	5	21,7%
Total	8	100,0%	8	100,0%	13	100,0%	10	100,0%	23	100,0%
Girona										
<15	1	2,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,3%	0	,0%
15-19	1	2,9%	1	1,8%	0	,0%	2	4,5%	2	4,7%
20-24	5	14,7%	5	8,8%	7	14,3%	4	9,1%	6	14,0%
25-34	11	32,4%	19	33,3%	13	26,5%	15	34,1%	13	30,2%
35-44	8	23,5%	19	33,3%	15	30,6%	10	22,7%	14	32,6%
>=45	8	23,5%	13	22,8%	14	28,6%	12	27,3%	8	18,6%
Total	34	100,0%	57	100,0%	49	100,0%	44	100,0%	43	100,0%
Lleida										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	6,7%	3	17,6%	0	,0%	0	,0%
20-24	1	11,1%	5	33,3%	3	17,6%	1	7,7%	5	27,8%
25-34	7	77,8%	5	33,3%	8	47,1%	2	15,4%	8	44,4%
35-44	1	11,1%	1	6,7%	2	11,8%	6	46,2%	3	16,7%
>=45	0	,0%	3	20,0%	1	5,9%	4	30,8%	2	11,1%
Total	9	100,0%	15	100,0%	17	100,0%	13	100,0%	18	100,0%
Camp de Tarragona										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	10,0%	0	,0%
20-24	3	27,3%	1	20,0%	0	,0%	1	10,0%	3	20,0%
25-34	4	36,4%	3	60,0%	4	44,4%	6	60,0%	2	13,3%
35-44	2	18,2%	0	,0%	3	33,3%	1	10,0%	4	26,7%
>=45	2	18,2%	1	20,0%	2	22,2%	1	10,0%	6	40,0%
Total	11	100,0%	5	100,0%	9	100,0%	10	100,0%	15	100,0%
Terres de l'Ebre										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	16,7%	2	50,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	66,7%	1	25,0%
35-44	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	25,0%
>=45	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	1	16,7%	0	,0%
Total	1	100,0%	2	100,0%	1	100,0%	6	100,0%	4	100,0%

Taula 8. Nombre de casos de gonocòccia segons edat i regió sanitària, 2007-2011

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%
15-19	19	5,1%	18	5,2%	21	5,1%	20	3,8%	25	4,9%
20-24	73	19,7%	64	18,6%	79	19,1%	102	19,2%	80	15,7%
25-34	171	46,1%	155	45,1%	192	46,4%	255	48,0%	214	42,0%
35-44	75	20,2%	69	20,1%	84	20,3%	110	20,7%	124	24,4%
>=45	33	8,9%	38	11,0%	38	9,2%	44	8,3%	65	12,8%
Total	371	100,0%	344	100,0%	414	100,0%	531	100,0%	509	100,0%
Alt Pirineu i Aran										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	2	66,7%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	3	100,0%	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
Barcelona ciutat										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
15-19	9	4,7%	9	4,4%	11	4,3%	6	1,9%	7	2,8%
20-24	31	16,1%	31	15,1%	45	17,6%	54	16,9%	31	12,3%
25-34	97	50,5%	103	50,2%	125	48,8%	164	51,3%	118	46,8%
35-44	38	19,8%	42	20,5%	53	20,7%	76	23,8%	62	24,6%
>=45	17	8,9%	20	9,8%	22	8,6%	20	6,3%	33	13,1%
Total	192	100,0%	205	100,0%	256	100,0%	320	100,0%	252	100,0%
Barcelona-Zona Vallès										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	2	9,5%	4	8,7%	5	9,8%
20-24	8	21,1%	4	28,6%	4	19,0%	11	23,9%	13	25,5%
25-34	17	44,7%	6	42,9%	9	42,9%	18	39,1%	20	39,2%
35-44	8	21,1%	3	21,4%	4	19,0%	7	15,2%	7	13,7%
>=45	5	13,2%	1	7,1%	2	9,5%	6	13,0%	6	11,8%
Total	38	100,0%	14	100,0%	21	100,0%	46	100,0%	46	100,0%
Barcelona-Zona Sud										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	3	13,0%	1	3,4%	3	11,5%	0	,0%	5	10,0%
20-24	8	34,8%	8	27,6%	6	23,1%	9	28,1%	11	22,0%
25-34	6	26,1%	11	37,9%	9	34,6%	12	37,5%	16	32,0%
35-44	4	17,4%	5	17,2%	4	15,4%	8	25,0%	14	28,0%
>=45	2	8,7%	4	13,8%	4	15,4%	3	9,4%	4	8,0%
Total	23	100,0%	29	100,0%	26	100,0%	32	100,0%	50	100,0%
Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	2	11,8%	2	9,1%	1	3,7%	2	6,5%	3	7,3%
20-24	4	23,5%	5	22,7%	4	14,8%	9	29,0%	6	14,6%
25-34	8	47,1%	9	40,9%	9	33,3%	16	51,6%	16	39,0%
35-44	1	5,9%	5	22,7%	9	33,3%	1	3,2%	11	26,8%
>=45	2	11,8%	1	4,5%	4	14,8%	3	9,7%	5	12,2%
Total	17	100,0%	22	100,0%	27	100,0%	31	100,0%	41	100,0%

Taula 8. Nombre de casos de gonocòccia segons edat i regió sanitària, 2007-2011 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya Central										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	16,7%	0	,0%	0	,0%	1	5,0%
20-24	4	30,8%	2	33,3%	3	50,0%	1	11,1%	4	20,0%
25-34	6	46,2%	1	16,7%	2	33,3%	4	44,4%	3	15,0%
35-44	3	23,1%	2	33,3%	0	,0%	3	33,3%	9	45,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	1	16,7%	1	11,1%	3	15,0%
Total	13	100,0%	6	100,0%	6	100,0%	9	100,0%	20	100,0%
Girona										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	5	8,2%	3	6,1%	3	4,8%	6	8,6%	2	2,9%
20-24	13	21,3%	12	24,5%	16	25,4%	12	17,1%	10	14,7%
25-34	24	39,3%	16	32,7%	27	42,9%	34	48,6%	30	44,1%
35-44	12	19,7%	10	20,4%	12	19,0%	11	15,7%	16	23,5%
>=45	7	11,5%	8	16,3%	5	7,9%	7	10,0%	10	14,7%
Total	61	100,0%	49	100,0%	63	100,0%	70	100,0%	68	100,0%
Lleida										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	1	33,3%	0	,0%	2	66,7%	0	,0%
25-34	2	66,7%	1	33,3%	7	100,0%	1	33,3%	1	33,3%
35-44	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	33,3%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	33,3%
Total	3	100,0%	3	100,0%	7	100,0%	3	100,0%	3	100,0%
Camp de Tarragona										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	6,3%	2	11,8%
20-24	2	18,2%	0	,0%	1	14,3%	4	25,0%	3	17,6%
25-34	4	36,4%	6	75,0%	4	57,1%	4	25,0%	7	41,2%
35-44	5	45,5%	1	12,5%	2	28,6%	3	18,8%	3	17,6%
>=45	0	,0%	1	12,5%	0	,0%	4	25,0%	2	11,8%
Total	11	100,0%	8	100,0%	7	100,0%	16	100,0%	17	100,0%
Terres de l'Ebre										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	1	14,3%	1	100,0%	1	33,3%	0	,0%
20-24	1	10,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	28,6%
25-34	6	60,0%	2	28,6%	0	,0%	1	33,3%	3	42,9%
35-44	3	30,0%	1	14,3%	0	,0%	1	33,3%	1	14,3%
>=45	0	,0%	3	42,9%	0	,0%	0	,0%	1	14,3%
Total	10	100,0%	7	100,0%	1	100,0%	3	100,0%	7	100,0%

Taula 9. Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons edat i regió sanitària, 2007-2011

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,6%	4	4,5%
25-34	1	14,3%	9	25,7%	7	50,0%	12	42,9%	40	44,9%
35-44	6	85,7%	18	51,4%	6	42,9%	13	46,4%	35	39,3%
>=45	0	,0%	8	22,9%	1	7,1%	2	7,1%	10	11,2%
Total	7	100,0%	35	100,0%	14	100,0%	28	100,0%	89	100,0%
Alt Pirineu i Aran										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Barcelona ciutat										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	4,8%
25-34	1	14,3%	9	32,1%	5	50,0%	11	45,8%	36	42,9%
35-44	6	85,7%	14	50,0%	4	40,0%	11	45,8%	35	41,7%
>=45	0	,0%	5	17,9%	1	10,0%	2	8,3%	9	10,7%
Total	7	100,0%	28	100,0%	10	100,0%	24	100,0%	84	100,0%
Barcelona-Zona Vallès										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
Barcelona-Zona Sud										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	1	100,0%	2	66,7%
35-44	0	,0%	2	66,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	1	33,3%
Total	0	,0%	3	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	3	100,0%
Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	100,0%
35-44	0	,0%	2	66,7%	1	100,0%	1	100,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	3	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%

Taula 9. Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons edat i regió sanitària, 2007-2011 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya Central										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	0	,0%
Girona										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
Lleida										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Camp de Tarragona										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Terres de l'Ebre										
<15	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
15-19	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
20-24	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
25-34	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
35-44	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
>=45	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Taula 10. Nombre de casos de sífilis segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2011

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya										
Home Heterosexual	18	7,9%	54	15,6%	43	11,6%	49	10,6%	49	9,4%
HSH	94	41,0%	163	47,1%	218	58,6%	289	62,7%	298	56,9%
Dona Heterosexual	20	8,7%	29	8,4%	31	8,3%	28	6,1%	46	8,8%
Transsexual	0	,0%	1	,3%	2	,5%	5	1,1%	9	1,7%
Desconegut	97	42,4%	99	28,6%	78	21,0%	90	19,5%	122	23,3%
Total	229	100,0%	346	100,0%	372	100,0%	461	100,0%	524	100,0%
Alt Pirineu i Aran										
Home Heterosexual	1	100,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	1	100,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Barcelona ciutat										
Home Heterosexual	9	6,9%	22	11,1%	19	8,9%	21	7,3%	19	6,5%
HSH	74	56,5%	120	60,3%	152	71,4%	224	77,8%	215	73,9%
Dona Heterosexual	6	4,6%	13	6,5%	12	5,6%	13	4,5%	18	6,2%
Transsexual	0	,0%	1	,5%	2	,9%	3	1,0%	7	2,4%
Desconegut	42	32,1%	43	21,6%	28	13,1%	27	9,4%	32	11,0%
Total	131	100,0%	199	100,0%	213	100,0%	288	100,0%	291	100,0%
Barcelona-Zona Vallès										
Home Heterosexual	1	7,1%	1	10,0%	4	23,5%	2	11,8%	3	7,5%
HSH	4	28,6%	4	40,0%	8	47,1%	11	64,7%	22	55,0%
Dona Heterosexual	1	7,1%	0	,0%	2	11,8%	1	5,9%	9	22,5%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	8	57,1%	5	50,0%	3	17,6%	3	17,6%	6	15,0%
Total	14	100,0%	10	100,0%	17	100,0%	17	100,0%	40	100,0%
Barcelona-Zona Sud										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	2	6,7%	3	7,1%	5	9,4%
HSH	6	40,0%	12	42,9%	11	36,7%	25	59,5%	24	45,3%
Dona Heterosexual	0	,0%	1	3,6%	2	6,7%	0	,0%	6	11,3%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	0	,0%
Desconegut	9	60,0%	15	53,6%	15	50,0%	13	31,0%	18	34,0%
Total	15	100,0%	28	100,0%	30	100,0%	42	100,0%	53	100,0%
Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme										
Home Heterosexual	0	,0%	1	4,8%	1	4,3%	2	6,5%	1	2,7%
HSH	1	25,0%	7	33,3%	13	56,5%	9	29,0%	9	24,3%
Dona Heterosexual	2	50,0%	1	4,8%	0	,0%	1	3,2%	1	2,7%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	1	25,0%	12	57,1%	9	39,1%	19	61,3%	26	70,3%
Total	4	100,0%	21	100,0%	23	100,0%	31	100,0%	37	100,0%

Taula 10. Nombre de casos de sífilis segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2011 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya Central										
Home Heterosexual	2	25,0%	1	12,5%	2	15,4%	3	30,0%	3	13,0%
HSH	2	25,0%	1	12,5%	7	53,8%	3	30,0%	6	26,1%
Dona Heterosexual	1	12,5%	1	12,5%	0	,0%	2	20,0%	3	13,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	4,3%
Desconegut	3	37,5%	5	62,5%	4	30,8%	2	20,0%	10	43,5%
Total	8	100,0%	8	100,0%	13	100,0%	10	100,0%	23	100,0%
Girona										
Home Heterosexual	3	8,6%	17	29,8%	8	16,3%	9	20,5%	9	20,9%
HSH	4	11,4%	15	26,3%	19	38,8%	8	18,2%	14	32,6%
Dona Heterosexual	2	5,7%	7	12,3%	7	14,3%	7	15,9%	4	9,3%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,3%	1	2,3%
Desconegut	26	74,3%	18	31,6%	15	30,6%	19	43,2%	15	34,9%
Total	35	100,0%	57	100,0%	49	100,0%	44	100,0%	43	100,0%
Lleida										
Home Heterosexual	0	,0%	9	60,0%	7	41,2%	8	61,5%	6	33,3%
HSH	0	,0%	0	,0%	1	5,9%	2	15,4%	4	22,2%
Dona Heterosexual	1	11,1%	5	33,3%	7	41,2%	2	15,4%	2	11,1%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	8	88,9%	1	6,7%	2	11,8%	1	7,7%	6	33,3%
Total	9	100,0%	15	100,0%	17	100,0%	13	100,0%	18	100,0%
Camp de Tarragona										
Home Heterosexual	2	18,2%	2	40,0%	0	,0%	0	,0%	3	20,0%
HSH	3	27,3%	2	40,0%	6	66,7%	3	30,0%	4	26,7%
Dona Heterosexual	6	54,5%	1	20,0%	1	11,1%	2	20,0%	1	6,7%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	2	22,2%	5	50,0%	7	46,7%
Total	11	100,0%	5	100,0%	9	100,0%	10	100,0%	15	100,0%
Terres de l'Ebre										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	16,7%	0	,0%
HSH	0	,0%	2	100,0%	1	100,0%	4	66,7%	0	,0%
Dona Heterosexual	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	50,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	16,7%	2	50,0%
Total	1	100,0%	2	100,0%	1	100,0%	6	100,0%	4	100,0%

Taula 11. Nombre de casos de gonocòccia segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2011

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya										
Home Heterosexual	51	13,7%	90	26,2%	98	23,7%	142	26,7%	97	19,1%
HSH	56	15,0%	101	29,4%	166	40,1%	196	36,9%	140	27,5%
Dona Heterosexual	14	3,8%	23	6,7%	50	12,1%	62	11,7%	64	12,6%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,2%	0	,0%
Desconegut	252	67,6%	130	37,8%	99	23,9%	130	24,5%	209	40,9%
Total	373	100,0%	344	100,0%	414	100,0%	531	100,0%	510	100,0%
Alt Pirineu i Aran										
Home Heterosexual	3	100,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	1	100,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	3	100,0%	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%	1	100,0%
Barcelona ciutat										
Home Heterosexual	23	12,0%	51	24,9%	48	18,8%	63	19,7%	43	17,1%
HSH	48	25,0%	82	40,0%	130	50,8%	159	49,7%	115	45,6%
Dona Heterosexual	6	3,1%	10	4,9%	30	11,7%	36	11,3%	31	12,3%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,3%	0	,0%
Desconegut	115	59,9%	62	30,2%	47	18,4%	61	19,1%	63	25,0%
Total	192	100,0%	205	100,0%	256	100,0%	320	100,0%	252	100,0%
Barcelona-Zona Vallès										
Home Heterosexual	6	15,4%	6	42,9%	2	9,5%	15	32,6%	7	13,7%
HSH	0	,0%	2	14,3%	8	38,1%	11	23,9%	7	13,7%
Dona Heterosexual	0	,0%	1	7,1%	6	28,6%	11	23,9%	17	33,3%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	33	84,6%	5	35,7%	5	23,8%	9	19,6%	20	39,2%
Total	39	100,0%	14	100,0%	21	100,0%	46	100,0%	51	100,0%
Barcelona-Zona Sud										
Home Heterosexual	3	13,0%	3	10,3%	5	19,2%	8	25,0%	10	20,0%
HSH	4	17,4%	8	27,6%	12	46,2%	8	25,0%	8	16,0%
Dona Heterosexual	1	4,3%	5	17,2%	4	15,4%	2	6,3%	3	6,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	15	65,2%	13	44,8%	5	19,2%	14	43,8%	29	58,0%
Total	23	100,0%	29	100,0%	26	100,0%	32	100,0%	50	100,0%
Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme										
Home Heterosexual	3	17,6%	6	27,3%	3	11,1%	4	12,9%	3	7,3%
HSH	0	,0%	3	13,6%	5	18,5%	3	9,7%	6	14,6%
Dona Heterosexual	0	,0%	3	13,6%	2	7,4%	3	9,7%	5	12,2%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	14	82,4%	10	45,5%	17	63,0%	21	67,7%	27	65,9%
Total	17	100,0%	22	100,0%	27	100,0%	31	100,0%	41	100,0%

Taula 11. Nombre de casos de gonocòccia segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2011 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya Central										
Home Heterosexual	3	23,1%	3	50,0%	2	33,3%	1	11,1%	5	25,0%
HSH	0	,0%	1	16,7%	2	33,3%	4	44,4%	1	5,0%
Dona Heterosexual	1	7,7%	1	16,7%	1	16,7%	2	22,2%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	9	69,2%	1	16,7%	1	16,7%	2	22,2%	14	70,0%
Total	13	100,0%	6	100,0%	6	100,0%	9	100,0%	20	100,0%
Girona										
Home Heterosexual	3	4,8%	15	30,6%	31	49,2%	43	61,4%	19	27,9%
HSH	0	,0%	1	2,0%	7	11,1%	5	7,1%	2	2,9%
Dona Heterosexual	3	4,8%	2	4,1%	6	9,5%	7	10,0%	6	8,8%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	56	90,3%	31	63,3%	19	30,2%	15	21,4%	41	60,3%
Total	62	100,0%	49	100,0%	63	100,0%	70	100,0%	68	100,0%
Lleida										
Home Heterosexual	0	,0%	1	33,3%	3	42,9%	1	33,3%	1	33,3%
HSH	0	,0%	1	33,3%	1	14,3%	1	33,3%	1	33,3%
Dona Heterosexual	1	33,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	2	66,7%	1	33,3%	3	42,9%	1	33,3%	1	33,3%
Total	3	100,0%	3	100,0%	7	100,0%	3	100,0%	3	100,0%
Camp de Tarragona										
Home Heterosexual	6	54,5%	4	50,0%	4	57,1%	5	31,3%	7	41,2%
HSH	1	9,1%	0	,0%	1	14,3%	5	31,3%	0	,0%
Dona Heterosexual	2	18,2%	0	,0%	1	14,3%	1	6,3%	1	5,9%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	2	18,2%	4	50,0%	1	14,3%	5	31,3%	9	52,9%
Total	11	100,0%	8	100,0%	7	100,0%	16	100,0%	17	100,0%
Terres de l'Ebre										
Home Heterosexual	1	10,0%	1	14,3%	0	,0%	1	33,3%	2	28,6%
HSH	3	30,0%	3	42,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	14,3%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	6	60,0%	3	42,9%	1	100,0%	2	66,7%	4	57,1%
Total	10	100,0%	7	100,0%	1	100,0%	3	100,0%	7	100,0%

Taula 12. Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2011

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	1	7,1%	1	3,6%	0	,0%
HSH	7	100,0%	35	100,0%	13	92,9%	27	96,4%	86	96,6%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,4%
Total	7	100,0%	35	100,0%	14	100,0%	28	100,0%	89	100,0%
Alt Pirineu i Aran										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Barcelona ciutat										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	7	100,0%	28	100,0%	10	100,0%	24	100,0%	81	96,4%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,6%
Total	7	100,0%	28	100,0%	10	100,0%	24	100,0%	84	100,0%
Barcelona-Zona Vallès										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
Barcelona-Zona Sud										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	3	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	3	100,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	3	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	3	100,0%
Barcelona-Zona Barcelonès Nord i Maresme										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	3	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	3	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%

Taula 12. Nombre de casos de limfogranuloma veneri segons via de transmissió per regió sanitària, 2007-2011 (continuació)

	2007		2008		2009		2010		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catalunya Central										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	1	50,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	2	100,0%	0	,0%	0	,0%
Girona										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%
Lleida										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Camp de Tarragona										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Terres de l'Ebre										
Home Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
HSH	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Dona Heterosexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Transsexual	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Desconegut	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
Total	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Figura 1. Evolució dels casos de sífilis. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 1992-2011




Figura 2. Evolució dels casos de gonocòccia segons quarts d'any. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 3. Evolució dels casos de sífilis segons sexe. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 4. Distribució dels casos de sífilis segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 5. Distribució dels casos de sífilis segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011




Figura 6. Evolució dels casos de sífilis segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 7. Distribució dels casos de sífilis segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 8. Distribució dels casos de sífilis segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 9. Distribució dels casos de sífilis en immigrants segons zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011




Figura 10. Distribució dels casos de sífilis segons coinfecció amb el VIH. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 11. Distribució dels casos de sífilis segons coinfecció amb el VIH i orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011




Figura 12. Evolució dels casos de gonocòccia. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 1992-2011




Figura 13. Evolució dels casos de gonocòccia segons quarts d'any. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 14. Evolució dels casos de gonocòccia segons sexe. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 15. Distribució dels casos de gonocòccia segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011



Figura 16. Distribució dels casos de gonocòccia segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011




Figura 17. Evolució dels casos de gonocòccia segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 18. Distribució dels casos de gonocòccia segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 19. Distribució dels casos de gonocòccia segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 20. Distribució dels casos de gonocòccia en immigrants segons zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011




Figura 21. Distribució dels casos de gonocòccia segons coinfecció amb el VIH. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 22. Distribució dels casos de gonocòccia segons coinfecció amb el VIH i orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011




Figura 23. Evolució dels casos de limfogranuloma veneri. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 24. Evolució dels casos de limfogranuloma veneri segons quarts d'any. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2012




Figura 25. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 26. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons sexe i edat. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011




Figura 27. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons orientació sexual. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 28. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons país d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 29. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri en immigrants segons zona geogràfica d'origen. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2011




Figura 30. Distribució dels casos de limfogranuloma veneri segons coinfecció amb el VIH. Registre MDO individualitzada de Catalunya, 2007-2011




Figura 31. Evolució dels casos d'infecció genital per *Chlamydia trachomatis* D-K . Registre MDO numèrica de Catalunya, 1992-2011




Figura 32. Evolució dels casos d'infecció genital pel *virus de l'herpes simple*. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2011




Figura 33. Evolució dels casos de condiloma acuminat. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2011





Figura 34. Evolució dels casos d'infecció per *Tricomonas Vaginalis*. Registre MDO numèrica de Catalunya, 2007-2011



Suggeriment per a la citació de l'informe complet:
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT). Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya. Actualització a 30 de juny de 2012. Badalona: CEEISCAT; 2012.