

PREVALENCIA DEL VIH Y OTRAS ITS EN PERSONAS QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN

Mar Vera⁽¹⁾, Carmen Rodríguez⁽¹⁾, Teresa Puerta⁽¹⁾, Oskar Ayerdi⁽²⁾, Jorge Pérez⁽³⁾, Begoña Baza⁽¹⁾, Blanca Menéndez⁽³⁾, Almudena Lillo⁽¹⁾, Natividad Jerez⁽¹⁾, Sonsoles del Corral⁽¹⁾, Marta Ruiz⁽¹⁾, Inmaculada Mozo⁽¹⁾, Juan Carlos Carrió⁽¹⁾, Montserrat Raposo⁽¹⁾, Jorge del Romero⁽¹⁾.
 CS Sandoval. IdISSC, Madrid⁽¹⁾; Fundación Jimenez Díaz, Madrid⁽²⁾; Hospital Virgen de la Luz, Cuenca⁽³⁾.

OBJETIVOS

- 1) Analizar la prevalencia del VIH y otras ITS concomitantes en personas que ejercen prostitución (PEP) en el Centro Sanitario Sandoval, en Madrid.
- 2) Describir el perfil de las PEP recién diagnosticadas de infección por el VIH.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo de los hombres, mujeres y transexuales que ejercen prostitución diagnosticados del VIH, entre 2007-2012. La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario epidemiológico validado y estandarizado. El VIH se diagnosticó mediante EIA de 4ª generación (Abbott) y la confirmación por Western blot. El recuento de linfocitos T CD4+/CD8+ se llevó a cabo mediante citometría de flujo (Coulter). Se realizaron pruebas específicas de otras ITS.

RESULTADOS

Durante el período de estudio se realizaron 34.627 serologías del VIH de las que 2.990 (9%) correspondían a PEP: 329 hombres (HEP), 118 transexuales (TEP) y 2.543 mujeres (MEP). Del total de los nuevos diagnosticados del VIH, 1.629, el 9% (144) habían ejercido prostitución en los últimos 12 meses previos al diagnóstico del VIH: el 73% (105) eran HEP, el 16% (23) TEP y el 11% (16) MEP.

El 76,2% tenía pruebas previas negativas.

La media de edad fue de 28 años en los HEP y las TEP. En cambio las MEP tenían una media de edad de 32 años. La mayoría procedían de Latinoamérica y tenían nivel de estudios primarios o secundarios. Según la situación administrativa: la mitad de los HEP y el 70% de las TEP y MEP se encontraban en situación irregular y no tenían tarjeta sanitaria.

Alrededor del 90% de las PEP referían haber tenido más de cien parejas sexuales en el último año y más de mil parejas sexuales a lo largo de su vida. Casi el 70% tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años.


El posible transmisor del VIH en las MEP fue su pareja estable. En cambio en los HEP y TEP fueron las parejas ocasionales y/o los clientes de prostitución.

Características de las personas que ejercen prostitución, en función del sexo

	Prevalencia VIH	Antecedentes de ITS	ITS concomitantes	CD4* < 200 cel/μl	CD4* > 350 cel/μl
HEP (N=329)	32% (105/329)	69,5%	52,4%	2,3%	87%
MEP (N=2.543)	0,6% (16/2.543)	50%	37,5%	0%	75%
TEP (N=118)	19,5% (23/118)	69,6%	34,8%	12,5%	62,5%

Coinfección del VIH y otras ITS
 NG: *Neisseria gonorrhoeae*; CT: *Chlamydia trachomatis*; TP: *Treponema pallidum*

Consumo de tóxicos y relaciones sexuales no protegidas bajo el efecto de estos (RSNP)



CONCLUSIONES

La prevalencia del VIH y otras ITS es muy elevada entre los trabajadores del sexo, masculinos y transexuales, la mayoría extranjeros y consumidores habituales de tóxicos, que deberían ser diana para la creación de programas preventivos específicos.