

Informe sobre
l'indicador de
morbiditat:

NOTIFICACIÓ DE NOUS CASOS D'INFECCIÓ PEL VIH

Any 2020

Canal Salut
> Drogues
Drogues.gencat

Salut/Agència de Salut Pública de Catalunya

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Alguns drets reservats

© 2021, Generalitat de Catalunya.
Departament de Salut.
Agència de Salut Pública de Catalunya
Sub-direcció General de Drogodependències



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la [pàgina web de Creative Commons](#).

Edita:

Agència de Salut Pública de Catalunya
Sub-direcció General de Drogodependències

Primera edició:

Barcelona, Agost de 2021.

Assessorament lingüístic:

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

Disseny gràfic:

Sub-direcció General de Drogodependències

Disseny de plantilla accessible 1.03:

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.

Sumari

Introducció	5
Glossari de sigles	6
1. Notificació de nous casos d'infecció pel VIH	7
2. Diagnòstic tardà de la infecció pel VIH	9

Introducció

Una de les preocupacions principals que hi ha respecte del consum de substàncies psicoactives la constitueixen les malalties associades amb aquest consum, és a dir, la comorbiditat. A part dels problemes que es puguin generar pel consum estricte de la substància, n'hi poden haver altres de relacionats amb la via d'administració de la droga, sobretot en el cas del consum per via parenteral. Les malalties que més s'han associat amb aquest tipus de consum han estat les produïdes pel virus de la immunodeficiència humana, pel virus de l'hepatitis C i pel virus de l'hepatitis B.

L'objectiu d'aquest informe és conèixer l'evolució dels casos d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), ja siguin casos nous o diagnòstics de manera tardana tenint en compte la possible via de contagi.

Aquestes dades són facilitades pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT).

Glossari de sigles

- VIH Virus de la immunodeficiència humana
- HSH Homes que tenen relacions sexuals amb homes
- HTS Heterosexuals
- PID Persones que s'injecten drogues


Notificació de nous casos d'infecció pel VIH

1

El nombre de diagnòstics nous d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) notificats a Catalunya l'any 2019 va ser de 471, que representen una taxa de 6,1 casos per 100.000 habitants. Més de la meitat dels diagnòstics notificats, el 61% va ser d'homes que tenen relacions sexuals amb homes (HSH), i el 16% i el 10% dels diagnòstics notificats van ser d'homes heterosexuais (homes HTS) i dones heterosexuais (dones HTS), respectivament. Es van notificar 18 diagnòstics del VIH, un 4% del total, entre persones que s'injecten drogues (PID) i no se'n va notificar cap cas de transmissió vertical.

A la figura 1, es mostra l'evolució del nombre de diagnòstics nous del VIH des de l'any 2001, i s'hi observa una tendència a la baixa, i l'any 2019 és el que presenta valors més baixos de notificació de casos nous. En aquest darrer any, el nombre casos de VIH va disminuir de 613 a 471 casos, un 23,2%, respecte a l'any anterior, seguint la tendència descendent dels darrers anys.


Figura 1. Evolució dels nous diagnòstics del VIH segons la via de transmissió



PID: persones que s'injecten drogues. HTS: heterosexuais. HSH: homes que tenen relacions sexuals amb homes.

Tal i com es pot veure a la figura 2, la transmissió sexual entre homes que tenen relacions sexuals amb homes presenta el percentatge més elevat de tot el període, i l'any 2019 és del 61%. Malgrat l'augment del percentatge de casos, el nombre de nous diagnòstics del VIH en els HSH ha disminuït durant el darrer any, després d'una tendència relativament estable. En el cas dels homes i dones heterosexuales, els nous diagnòstics del VIH segueixen disminuint al llarg dels anys. Cal destacar la disminució al llarg dels anys del percentatge de nous diagnòstics del VIH en el cas de les persones que s'injecten drogues: del 7% l'any 2010 a un 4% l'any 2019. També ha disminuït el nombre de nous casos diagnosticats del VIH, que passa de 65 casos el 2010 a 18 casos el 2019.

Figura 2. Evolució del percentatge dels nous diagnòstics del VIH segons la via de transmissió




PID: persones que s'injecten drogues. HTS: heterosexuales. HSH: homes que tenen relacions sexuals amb homes.

Diagnòstic tardà de la infecció pel VIH

2

Es defineix com a *diagnòstic tardà* d'infecció pel VIH el que es fa quan la xifra del recompte de limfòcits T CD4 més pròxima a aquest diagnòstic és inferior a 350 cèl·l./microlitre (μL). A continuació es pot veure la figura 3, que exposa el percentatge de casos amb diagnòstic tardà de la malaltia en funció de la via de transmissió. Tot i que s'hi observen lleugeres variacions al llarg dels anys, es pot veure en totes les vies de transmissió una tendència a la baixa en el percentatge de diagnòstics tardans, i l'any 2019 és el que en presenta valors inferiors. Globalment, el percentatge de diagnòstic tardà de la infecció pel VIH dels darrers deu anys mostra un descens, que passa del 49% el 2010 al 36% l'any 2019. En el cas concret de les persones que s'injecten drogues, ha disminuït el percentatge de diagnòstics tardans del 60% l'any 2010 al 36% el 2019.

Figura 3. Grups de transmissió del VIH. Evolució del diagnòstic tardà de la infecció pel VIH segons la via de transmissió



PID: persones que s'injecten drogues. HTS: heterosexuals. HSH: homes que tenen relacions sexuals amb homes.

S'han actualitzat les dades d'acord amb l'informe [Vigilància epidemiològica de la infecció pelVIH i la SIDA a Catalunya: informe anual 2019](#), que és l'últim informe disponible del CEEISCAT.

