

Día Mundial del SIDA 1 de diciembre del 2008

Dossier de prensa

Documentación incluida:

1. Materiales de la campaña de prevención del VIH 2008
2. Situación del VIH-SIDA en Asturias 2008.
3. Presentación del programa **“Educación Sexual con arte”** del Conseyu de la Mocedá del Principáu de Asturias, Espacio de Creación y Didáctica y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios que pretende abrir la reflexión sobre la sexualidad, la prevención y la identidad sexual a través del arte contemporáneo.

Información aportada por:

- Servicio de Vigilancia Epidemiológica
- Sección de Información Sanitaria.
- Programa de Prevención y Atención a las Personas Afectadas por el VIH-SIDA en Asturias (PAVSA)

Informe realizado por:

Programa de Prevención y Atención a las Personas Afectadas por el VIH-SIDA en Asturias (PAVSA)

Servicio de Salud Poblacional.

Dirección General de Salud Pública.

Información sobre actos del Día Mundial del VIH-SIDA:

www.pruebadeamor.org

Situación de la epidemia VIH-SIDA en Asturias



- En el 2008 se ha producido un incremento de las nuevas infecciones por VIH en hombres
- La principal vía de transmisión en las infecciones detectadas a lo largo del 2008 es la vía sexual. Dentro de la vía sexual, en hombres la principal práctica de riesgo para la adquisición de la infección ha sido la relación homo/bisexual sin protección.
- Las áreas sanitarias con mayor número de infecciones por VIH han sido Oviedo y Gijón.
- Las declaraciones de casos de SIDA, personas en fases avanzadas de la enfermedad, mantienen una tendencia descendente.

1. Aumento de nuevos casos de infección VIH. Más infecciones en hombres que en mujeres

Se produce un aumento en el número de nuevos casos de infección por VIH.

El número de nuevas infecciones de VIH notificadas en el 2008 a través del Sistema de Información Microbiológico ha sido de **150** (hasta el 15 de noviembre del 2008), correspondiendo una tasa de **139,5 nuevas infecciones por millón de habitantes**.

En hombres el número de nuevas infecciones ha sido de 125 (tasa de 242,58 nuevas infecciones por millón de habitantes) y en mujeres ha sido de 25 (tasa de 44,68 nuevas infecciones por millón de habitantes).



2. El principal segmento de edad afectado en el 2008 son los hombres entre 35 y 44 años

El 31% de las nuevas infecciones en el hombre en el 2008 se produce en el grupo de edad entre 35 y 44 años.

Declaraciones por grupo de edad en el momento del diagnóstico y sexo

Grupo edad	2004 Jl-Dc		2005 En-Dc		2006 En-Dc		2007 En-Dc		2008 En-Nv*		Total	%
	Muj er	Homb re	Muj er	Homb re	Muj er	Homb re	Muj er	Homb re	Muj er	Homb re		
≤14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
15-19	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	0,5%
20-24	3	4	1	3	1	5	6	4	4	12	43	7,0%
25-34	8	15	14	19	13	30	12	35	7	30	183	29,6
35-44	5	29	11	42	15	44	5	33	6	40	230	37,2
45-54	-	6	7	19	5	14	5	14	6	27	103	16,7
55-64	1	3	3	9	-	3	2	5	2	13	41	6,6%
≥65	-	1	-	4	1	4	-	2	-	3	15	2,4%
Total	17	58	37	97	35	101	30	93	25	125	618	



*hasta 15 de noviembre

3. Las prácticas sexuales de riesgo siguen siendo la principal vía de transmisión en las nuevas infecciones del 2008. Se han incrementado las relaciones homo/bisexuales sin protección.

Del total de 150 infecciones detectadas en el 2008, un 68% han sido por transmisión sexual y un 22% por prácticas de riesgo en el consumo de drogas por vía endovenosa. Este incremento respecto a la información del 2007 es a expensas del incremento de nuevas infecciones en las prácticas homo/bisexuales sin protección (de 36 casos en el 2007 a 55 casos en el 2008). De todas formas también se incrementan las infecciones en prácticas heterosexuales de riesgo (de 37 casos en el 2007 a 47 casos en el 2008).

	Total de nuevas infecciones VIH 2008
UDVPs	33
Relación Homo/Bisexual sin protección	55
Relación heterosexual sin protección	47
Desconocida	15
	150

(UDVPs: Usuario/a de drogas por vía parenteral)



4. Las Áreas Sanitarias con mayor número de infecciones han sido Oviedo y Gijón

Las nuevas infecciones siguen produciéndose en las áreas centrales y urbanas. De las 150 nuevas infecciones en el 2008, el 57,3% corresponden al Área y el 26% al Área V. Se ha observado un incremento en los nuevos casos en el Área IV respecto a años anteriores.

Distribución por Área Sanitaria y año

Área Sanitaria	2004 Jl-Dc	2005 En-Dc	2006 En-Dc	2007 En-Dc	2008 En-Nv*	Total
A-I	-	-	1	1	1	3
A-II	-	-	2	-	2	4
A-III	8	12	6	12	9	47
A-IV	35	67	63	57	86	308
A-V	22	44	48	42	39	195
A-VI	1	-	1	4	2	8
A-VII	6	4	8	3	4	25
A-VIII	3	7	7	4	7	28
Total	75	134	136	123	150	618


*hasta 15 de noviembre

5. Situación del SIDA en Asturias

Al interpretar los datos que se presentan en este informe en relación con la situación del SIDA, hay que tener en cuenta que la incidencia de SIDA es un indicador de la frecuencia y evolución de los estadios avanzados de la infección por VIH en la población. Este indicador es clave para evaluar la efectividad de los tratamientos y la precocidad del diagnóstico de la infección por VIH, las intervenciones que tienen mayor impacto en la evolución del sida tanto en el ámbito individual como comunitario; sin embargo, no aporta información sobre la frecuencia de nuevas infecciones por VIH en la población ni de su evolución reciente, pudiéndose dar el hecho de que aumenten las nuevas infecciones mientras los casos de sida sigan otra tendencia.

Desde junio de 1986 hasta el 30 de junio de 2008 se han registrado en Asturias **1426 casos de SIDA**, de los que constan como fallecidos 838, con una letalidad acumulada del 58,8%. En el último semestre (enero a junio de 2008) se han declarado en Asturias 11 nuevos casos de SIDA, lo que supone una incidencia media anual para 2008 de 2,04 casos por 100.000 habitantes; para este mismo periodo, en el conjunto de España se han declarado 290 casos, con una incidencia media anual de 1,26 casos por 100.000 habitantes. No obstante, debe considerarse que los datos del primer semestre de 2008 son provisionales, ya que, por las características diagnósticas de esta enfermedad, existe un apreciable retraso en la notificación de los nuevos casos.

**Incidencia anual de SIDA en Asturias y España
jun 1986 - jun 2008**



6. Mortalidad por SIDA

La mortalidad permanece estable en el grupo de hombres, manteniendo una tendencia similar a la observada desde el año 2.000 y claramente descendente desde la incorporación de la terapia antirretroviral combinada. En mujeres esta tendencia es aún de más claro descenso.

FIGURA

1. Número absoluto de fallecidos por SIDA por grupos de edad y sexo. Asturias 1996-2007




FIGURA 2. Tasa de mortalidad por SIDA por grupos de edad y sexo (tasa std europea). Asturias 1996-2007




FIGURA 3. Número absoluto de fallecidos por SIDA por sexo. Asturias 1996-2007.






FIGURA 4. Tasa de mortalidad por SIDA en Asturias 1996-2007 por año y sexo (tasa std europea).



7. Gasto farmacéutico en consumo de antirretrovirales

El tratamiento antirretroviral combinado ha sido uno de los elementos claves en la disminución de la mortalidad de las personas afectadas por el VIH-SIDA.


El gasto ha pasado de unos 7.626.208,78 euros en el año 2002 a 12.234.677,48 euros en el año 2007.



8. Convenios desarrollados desde el PAVSA en el 2008

Asociación	Cantidad (euros)
Comité Ciudadano AntiSIDA Asturias	80.000
Fundación Siloé	500.700
Médicos del Mundo	16.530
Consejo de la Juventud del Principado de Asturias	47.000
Xent Gai Astur (XEGA)	13.900
Gasto total	658.130

9. Pacientes a seguimiento por hospitales de Asturias:



10. Número de pruebas de VIH realizadas

La tendencia es de un claro aumento en la realización de las pruebas con un incremento muy significativo en el aumento de pruebas realizadas desde el 2006 al 2007




Tabla-resumen de algunos de los datos de la epidemia por VIH-SIDA en el 2008

Datos sobre VIH hasta 15 de noviembre de 2008

*Datos sobre SIDA hasta 30 de junio de 2008

Número de nuevas infecciones por VIH en el 2007	123 (Tasa 114,43 por millón de habitantes)
Número de nuevas infecciones por VIH en el 2008	150 (Tasa 139,55 por millón de habitantes)
Distribución de nuevos casos de VIH por sexo	125 (83,3%) hombres 25 (16,6 %) mujeres
Principal grupo de edad de nuevas infecciones VIH-SIDA	30,6% entre 35 y 44 años
Área Sanitarias de nuevas infecciones por VIH	57,3% en Área IV 26 % en Área V
*Nuevos casos de SIDA (Tasa por 100.00 habitantes)	11 (2,04)
Nuevos casos de VIH por categoría de transmisión	68% vía sexual (37% prácticas homo/bisexuales de riesgo; 32% prácticas heterosexuales de riesgo) 22% vía sanguínea (prácticas de riesgo en consumidores de drogas por vía endovenosa) 9 % desconocida
Número total de pacientes a seguimiento en hospitales de Asturias (enero 2008)	1646 pacientes

Tasa mortalidad por 100.000 habitantes (año 2006)	Hombre 4,3 Mujeres...2,3
Años Potenciales de Vida Perdidos (año 2006)	Hombres...532,5 Mujeres...372,5
Gasto en fármacos antirretrovirales en el año 2007	12.234.677,48 euros
Preservativos distribuidos gratuitamente a lo largo del año 2008	241.000 preservativos masculinos 5.500 preservativos femeninos
Número de pruebas de VIH realizadas	2006: 29063 pruebas 2007: 31320 pruebas
Presupuesto destinado a convenios con asociaciones	658.130 €